第1回補足

内力の和

講義ノート式 (40) で使う等式

$$\sum_i \sum_{j \neq i} \mathbf{F}_{ji} = \sum_i \sum_{j > i} (\mathbf{F}_{ji} + \mathbf{F}_{ij}) \tag{A.1}$$

および式 (48) で使う等式

$$\sum_i \left(\mathbf{r}_i \times \sum_{j \neq i} \mathbf{F}_{ji} \right) = \sum_i \sum_{j > i} (\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j) \times \mathbf{F}_{ji} \tag{A.2}$$

の説明。ただし和記号はそれぞれ以下の意味である：

$$\sum_i C_i = \sum_{i=1}^N C_i = C_1 + C_2 + \dots + C_N \tag{A.3}$$

$$\sum_{i \neq 3} C_i = C_1 + C_2 + C_4 + \dots + C_N \quad (i = 3 \text{ のみ含まず和をとる}) \tag{A.4}$$

$$\sum_{i > 3} C_i = C_4 + \dots + C_N \quad (3 \text{ より大きい } i \text{ のみの和をとる}) \tag{A.5}$$

図 A.2: 式 (A.1) の和の直感的な説明。

式 (A.1) の直感的な説明： $\mathbf{F}_{ji}$ の ji を行列の成分だと思えば、両辺とも非対角成分の和をとることに対応している (図 A.2)。条件をつけずに $\sum_i \sum_j$ とすると行列の全ての成分の和をとることになるので、左辺の $\sum_i \sum_{j \neq i}$ は j の和をとる際に i と異なる場合のみに制限することで、対角成分だけ飛ばして (つまり非対角成分のみの) 和をとることを表している。右辺の $\sum_i \sum_{j > i}$ は対角

図 A.3: $i > j$ の和。

成分をのぞいた上三角成分の和をとることに対応するので、 $\sum_i \sum_{j>i} F_{ji}$ と $\sum_i \sum_{j>i} F_{ij}$ を足すことで右上、左下両方の和をとっている。

式 (A.1) の式を使った説明：まず、 $j \neq i$ は $j > i$ または $j < i$ のどちらかなので、

$$\sum_i \sum_{j \neq i} F_{ji} = \sum_i \sum_{j > i} F_{ji} + \sum_i \sum_{j < i} F_{ji} \quad (\text{A.6})$$

である。右辺第2項は

- i を一つ固定し、その i に対して $j < i$ の条件を満たす j を 1 から $i-1$ まで足す、これを $i=1$ から N まで繰り返して全て足す

という意味だが、これは

- j を一つ固定し、その j に対して $j < i$ の条件を満たす i を $i+1$ から N まで足す、これを $j=1$ から N まで繰り返して全て足す

と言い換えることができる (図 A.3)¹。よって

$$\sum_i \sum_{j < i} F_{ji} = \sum_j \sum_{i < j} F_{ji} \quad (\text{A.7})$$

和をとる添字は任意なので、

$$\sum_j \sum_{i < j} F_{ji} = \sum_i \sum_{j > i} F_{ij} \quad (\text{A.8})$$

¹つまり和をとる順序は関係なく「 i, j についてそれぞれ 1 から N まで動かし、 $j < i$ の条件を満たすもののみ足す」とも言うことができる。

となり

$$\sum_i \sum_{j \neq i} \mathbf{F}_{ji} = \sum_i \sum_{j > i} \mathbf{F}_{ji} + \sum_i \sum_{j > i} \mathbf{F}_{ij} = \sum_i \sum_{j > i} (\mathbf{F}_{ji} + \mathbf{F}_{ij}) \quad (\text{A.9})$$

と式 (A.1) を得る。

式のイメージが湧かない場合は、具体的に両辺を書き下してみると良い。たとえば $N = 3$ の場合、左辺は

$$\begin{aligned} \sum_i \sum_{j \neq i} \mathbf{F}_{ji} &= \sum_{i=1}^3 \left(\sum_{j \neq i} \mathbf{F}_{ji} \right) \\ &= \underbrace{\sum_{j \neq 1} \mathbf{F}_{j1}}_{\mathbf{F}_{21} + \mathbf{F}_{31}} + \underbrace{\sum_{j \neq 2} \mathbf{F}_{j2}}_{\mathbf{F}_{12} + \mathbf{F}_{32}} + \underbrace{\sum_{j \neq 3} \mathbf{F}_{j3}}_{\mathbf{F}_{13} + \mathbf{F}_{23}} \\ &= \mathbf{F}_{21} + \mathbf{F}_{31} + \mathbf{F}_{12} + \mathbf{F}_{32} + \mathbf{F}_{13} + \mathbf{F}_{23} \end{aligned} \quad (\text{A.10})$$

右辺は

$$\begin{aligned} \sum_i \sum_{j > i} (\mathbf{F}_{ji} + \mathbf{F}_{ij}) &= \sum_{i=1}^3 \left(\sum_{j > i} (\mathbf{F}_{ji} + \mathbf{F}_{ij}) \right) \\ &= \underbrace{\sum_{j > 1} (\mathbf{F}_{j1} + \mathbf{F}_{1j})}_{\mathbf{F}_{21} + \mathbf{F}_{12} + \mathbf{F}_{31} + \mathbf{F}_{13}} + \underbrace{\sum_{j > 2} (\mathbf{F}_{j2} + \mathbf{F}_{2j})}_{\mathbf{F}_{32} + \mathbf{F}_{23}} + \underbrace{\sum_{j > 3} (\mathbf{F}_{j3} + \mathbf{F}_{3j})}_0 \\ &= \mathbf{F}_{21} + \mathbf{F}_{31} + \mathbf{F}_{12} + \mathbf{F}_{32} + \mathbf{F}_{13} + \mathbf{F}_{23} \end{aligned} \quad (\text{A.11})$$

となり一致していることが確認できる。

式 (A.2) の計算：

$$\sum_i \left(\mathbf{r}_i \times \sum_{j \neq i} \mathbf{F}_{ji} \right) = \sum_i \sum_{j \neq i} \mathbf{r}_i \times \mathbf{F}_{ji} \quad (\text{A.12})$$

ここで $\mathbf{r}_i \times \mathbf{F}_{ji}$ は添字 ji をもったベクトルなので、 $\mathbf{A}_{ji}$ とおく。このとき、添字に注意すると

$$\mathbf{A}_{ji} \equiv \mathbf{r}_i \times \mathbf{F}_{ji}, \quad \mathbf{A}_{ab} = \mathbf{r}_b \times \mathbf{F}_{ab}, \quad \mathbf{A}_{ij} = \mathbf{r}_j \times \mathbf{F}_{ij} \quad (\text{A.13})$$

であるので、式 (A.1) より

$$\sum_i \left(\mathbf{r}_i \times \sum_{j \neq i} \mathbf{F}_{ji} \right) = \sum_i \sum_{j \neq i} \mathbf{A}_{ji} = \sum_i \sum_{j > i} (\mathbf{A}_{ji} + \mathbf{A}_{ij}) \quad (\text{A.14})$$

$\mathbf{A}_{ji}$ を元に戻すと

$$\begin{aligned} \sum_i \left(\mathbf{r}_i \times \sum_{j \neq i} \mathbf{F}_{ji} \right) &= \sum_i \sum_{j > i} (\mathbf{r}_i \times \mathbf{F}_{ji} + \mathbf{r}_j \times \mathbf{F}_{ij}) \\ &= \sum_i \sum_{j > i} (\mathbf{r}_i \times \mathbf{F}_{ji} - \mathbf{r}_j \times \mathbf{F}_{ji}) \quad \leftarrow \text{作用反作用の法則 (32)} \\ &= \sum_i \sum_{j > i} (\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j) \times \mathbf{F}_{ji} \end{aligned} \quad (\text{A.15})$$

重心を基準とした座標による全角運動量

全角運動量の定義 (45) を重心を基準とした座標で書くと

$$\begin{aligned}
 \mathbf{L} &= \sum_i \mathbf{L}_i \\
 &= \sum_i \mathbf{r}_i \times m_i \mathbf{v}_i \\
 &= \sum_i m_i (\mathbf{R} + \mathbf{r}'_i) \times (\mathbf{V} + \mathbf{v}'_i) \\
 &= \mathbf{R} \times \mathbf{V} \sum_i m_i + \mathbf{R} \times \sum_i m_i \mathbf{v}'_i + \sum_i \{m_i \mathbf{r}'_i\} \times \mathbf{V} + \sum_i m_i \mathbf{r}'_i \times \mathbf{v}'_i
 \end{aligned} \tag{A.16}$$

となる。ここで

$$\sum_i m_i = M \tag{A.17}$$

$$\begin{aligned}
 \sum_i m_i \mathbf{v}'_i &= \sum_i m_i (\mathbf{v}_i - \mathbf{V}) \\
 &= \sum_i m_i \mathbf{v}_i - \mathbf{V} \sum_i m_i \\
 &= M\mathbf{V} - M\mathbf{V} \quad \leftarrow (35) \\
 &= \mathbf{0}
 \end{aligned} \tag{A.18}$$

$$\begin{aligned}
 \sum_i m_i \mathbf{r}'_i &= \sum_i m_i (\mathbf{r}_i - \mathbf{R}) \\
 &= \sum_i m_i \mathbf{r}_i - \mathbf{R} \sum_i m_i \\
 &= M\mathbf{R} - M\mathbf{R} \quad \leftarrow (33) \\
 &= \mathbf{0}
 \end{aligned} \tag{A.19}$$

を用いると

$$\begin{aligned}
 \mathbf{L} &= \mathbf{R} \times M\mathbf{V} + \mathbf{R} \times \mathbf{0} + \mathbf{0} \times \mathbf{V} + \sum_i \mathbf{r}'_i \times m_i \mathbf{v}'_i \\
 &= \mathbf{R} \times \mathbf{P} + \mathbf{L}', \quad \mathbf{L}' = \sum_i \mathbf{r}'_i \times \mathbf{p}'_i
 \end{aligned} \tag{A.20}$$

第1項は重心の角運動量、第2項は重心まわりの角運動量 $\mathbf{L}'$ である。